20

ALIMENTS À ÉVITER LORSQUE VOUS AVEZ LE VENTRE VIDE

comment-economiser.fr

©

À ÉVITER

— CROISSANTS & PAINS AU CHOCOLAT —

Les viennoiseries et autres aliments qui contiennent de la levure irritent les parois de l'estomac, ce qui provoque des flatulences.

— SUCRE —

Le sucre augmente les niveaux d'insuline et surcharge votre pancréas, qui vient tout juste de se réveiller. Avec le temps, cela peut entraîner un diabète.

— YAOURT & AUTRES PRODUITS LAITIERS FERMENTÉS —

Le lait fermenté du yaourt stimule la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Si vous le mangez à jeun, cela tue les bonnes bactéries de l'acide lactique. Au petit-déjeuner, les produits laitiers fermentés ont peu de valeur nutritive.

— POIRES —

Les fibres insolubles des poires crues sont trop agressives pour les muqueuses délicates de votre estomac lorsqu'il est vide.

— TOMATES —

Riches en acide tannique, les tomates augmentent le taux d'acidité de l'estomac. Consommées à jeun, elles peuvent même engendrer des ulcères gastriques.

— CONCOMBRES ET LÉGUMES VERTS —

Les légumes verts sont une excellente source d'acides aminés. Mais le matin, à jeun, ils sont trop acides pour votre organisme, ce qui peut engendrer des brûlures d'estomac, des flatulences et des douleurs gastriques.

— BANANES —

Riches en magnésium et en potassium, les bananes peuvent créer un déséquilibre dans l'organisme lorsque votre estomac est à vide le matin, et même nuire à la santé du cœur.

— ÉPICES —

Les épices stimulent la production de sucs gastriques. Lorsque vous mangez des aliments épicés à jeun, ces sucs irritent la muqueuse de l'estomac et augmentent le risque d'apparition de troubles digestifs.

— CAFÉ & THÉ —

Boire du café le ventre vide peut provoquer des brûlures d'estomac et même des indigestions. Le thé est aussi à éviter à jeun, car il réduit le taux d'acides dans l'estomac, ce qui engendre des troubles digestifs.

— AGRUMES —

Les agrumes sont riches en acides citriques. Mais lorsque l'estomac est vide, ils peuvent provoquer des douleurs d'estomac et augmenter le risque de gastrite et d'ulcères gastriques.